



OC GastroCare

대장 내시경을 위한 준비

최상의 검사를 위해서는 대장이 깨끗해야 합니다. 귀하의 검사 준비는 시술 전날 부터 시작됩니다. 시작하기 전에 아래의 지침을 주의 깊게 읽어주세요.

- 시술 3-5일 전부터 모든 혈액 희석제를 중단하세요. (Plavix, Xarelto, Eliquis, Brilinta, Coumadin 등)
- 시술 5일 전부터 아스피린 325mg 을 중단하세요
- 시술 5일 전부터 철분제를 중단하세요
- 시술 2일 전부터 비타민 C / E 중단하세요
- 시술 2일 전부터 모든 소염제를 중단하세요 (타일레놀은 복용하셔도 됩니다.)
- 당뇨가 있으신 경우, 시술 전날부터 모든 당뇨약을 절반의 양만 복용하세요.

다음의 당뇨 약을 복용하고 계신 경우, 시술 7일 전에 복용을 중단하셔야합니다.

- | | | | | | |
|-----------|-------------|------------|------------|------------|------------|
| - Ozempic | - Trulicity | - Byetta | - Victoza | - WeGovy | - Mounjaro |
| - Adlyxin | - Saxenda | - Bydureon | - Rybelsus | - Zepbound | |

현재 복용하고 계신 약들에 대한 질문이 있으시면 주치의에게 문의하세요

시술 전날 ____/____/20____
<p>모든 음식 금지. 맑은 액체만 섭취하실 수 있습니다</p> <p>물</p> <p>맑은 과일 주스</p> <p>차 (설탕 / 꿀 허용)</p> <p>맑은 소다</p> <p>맑은 젤라틴</p> <p>맑은 국물</p> <p>커피 (우유 금지)</p> <p>색소가 들어 가지 않은 스포츠 음료</p> <p>* 메스꺼움이 있으신 경우, 목캔디를 드시면 도움이 됩니다</p> <p>*** 흐리고 어두운 액체 섭취 금지</p>

- 위장이 제대로 비워지지 않으면, 수면 마취중에 메스꺼움을 느끼실 수 있고, 구토를 하시게 되면 구토물이 폐로 넘어가 폐렴을 일으킬 수 있고, 환자 분의 안전을 위해 시술이 중단되거나 취소될 수 있습니다.



OC GastroCare

EZ2GO 준비 방법

검사 전날 오후 7시

오후 5:00 시: **Miralax** 파우더 반 + 맛을 위한 **Gatorade** 패킷 반을 첫 번째 32oz 컵에 넣으세요. **Simethicone** 약 1알도 컵에 넣고 컵을 물로 채운 후 약이 녹을 때까지 섞으세요. 그리고 **Bisacodyl** 약 4알은 삼켜 드세요 (**Bisacodyl** 약은 녹지 않습니다.)

만드신 약물은 8oz씩 15분마다 끝까지 마시세요. (총 4번)

5:00 P.M.	5:15 P.M.	5:30 P.M.	5:45 P.M.
------------------	------------------	------------------	------------------

약물을 다 마신 후 생수 4컵을 마시세요. 그다음 원하시는 만큼 물을 더 마셔도 됩니다.

검사 당일 (5시간 전)

검사 5시간 전: 나머지 **Miralax** 파우더 반 + **Gatorade** 패킷 반을 두 번째 32oz 컵에 넣고 컵을 물로 채우신 후 섞으세요.

만드신 약물을 8 oz씩 15분마다 끝까지 마시세요. (총 4번)

--	--	--	--

****약물을 다 마신 후 시술이 끝날 때까지 입으로 아무것도 마시거나 드시지 마세요****

건조한 입의 경우 물로 입을 행굴 수 있지만 뱉어내야 합니다. 물을 삼키지 마세요. 배가 비어 있어야 합니다. 배가 차 있으면 구토나 다른 문제가 발생할 수 있습니다. 배가 비어 있지 않으면 시술이 취소될 겁니다. **참고)** 지시된 대로 준비 약을 먹지 않으면 대장이 제대로 세척되지 않아 시술이 취소되거나 반복하셔야 할 수 있습니다.

궁금한 사항이 있으시면 웹사이트 **www.ocgastrocare.com**을 방문하시거나 병원으로 전화해 주십시오. **번호: (714) 527-6000**