



PREPARACIÓN DE LA COLONOSCOPIA

Para realizar el mejor examen posible, su colon debe estar limpio. Su preparación comenzará el día antes de su procedimiento.

Lea atentamente las instrucciones antes de comenzar.

-AUTORIZACIÓN PENDIENTE: Detener los anticoagulantes (Plavix, Xarelto, Eliquis, Effient, Coumadin/Warfarina) DE TRES A CINCO DÍAS antes del procedimiento.

-Detener aspirina 325 mg CINCO DÍAS antes del procedimiento. -Detener Hierro CINCO DÍAS antes del procedimiento.

-Detener las vitaminas C y E DOS DÍAS antes del procedimiento. -Detener medicación antiinflamatoria DOS DÍAS antes del procedimiento. (Se puede tomar Tylenol).

Si es **DIABÉTICO**, tome media dosis de su medicamento para la diabetes a partir del día anterior a su(s) procedimiento(s). Si tiene más preguntas, consulte a su proveedor de atención primaria.

ATENCIÓN: Por favor **DETENER** siguientes medicamentos **7 días** antes de los procedimientos:

-OZEMPIC -BYETTA -ADLYXIN -BYDUREON -RYBELSUS

-TRULICIDAD -VICTOZA -SAXENDA -WEGOVY -ZEPBOUND -MOUNJARO

A PARTIR DEL ____ / ____ / 20____ TODO EL DÍA

DIETA DE LÍQUIDO CLARO

LOS LÍQUIDOS CLAROS INCLUYEN:

- Agua
- Caldo
- Agua de Coco (**SIN PULPA**)
- Jugos Claros (**SIN PULPA**) - Manzana, **BLANCO** Arándano, **BLANCO** Uva
- Café (**NEGRO - NO** productos lácteos)
- Té (**CALIENTE** o **FRÍO**), azúcar o miel está bien (**NO** productos lácteos)
- Bebidas deportivas: sólo claras, **NO** verde, morado o rojo
- Refrescos carbonatados claros - Sprite, 7UP y/o Ginger Ale
- Gelatina amarilla (**NO** coberturas) - **PARAR DESPUÉS DE LAS 5:00 P.M.**
- Puede utilizar pastillas mentoladas para ayudar a tolerar la preparación (pastillas para la tos Halls)
- ★ **NO tenga líquidos oscuros (rojo, naranja, verde, azul o morado)**
- ★ **NO consuma alimentos sólidos, productos lácteos y líquidos turbios.**
- ★ **DEJE de tomar todos los líquidos claros después de medianoche, excepto el agua.**

*Si tiene la boca seca, puede enjuagarse con agua y escupir. NO trague el agua. Si su estómago no está vacío, puede sentir náuseas con sedación y vomitar provocando neumonía.



OC GastroCare

EZ2GO PREPARACIÓN

EL DÍA ANTES DE SU PROCEDIMIENTO:

A las 5:00 P.M.: Mezcle la MITAD del polvo Miralax con un paquete de Gatorade al gusto en la primera taza de 32 oz. Agregue 1 tableta de simeticona al vaso. Luego llenar con agua y mezclar hasta que se disuelva por completo, tomar 4 Bisacodyl por vía oral. ****El bisacodilo está recubierto y no se disolverá en la copa****

Beba un vaso de 8 oz de la solución cada 15 minutos hasta terminar la mezcla.

5:00 P.M.	5:15 P.M.	5:30 P.M.	5:45 P.M.
------------------	------------------	------------------	------------------

Siga con 4 vasos de agua. Puede seguir tomando tanta agua como desee.

LA MAÑANA DE SU PROCEDIMIENTO **(5 HORAS ANTES DE SU PROCEDIMIENTO)**

5 HORAS antes de su procedimiento: Mezcle la otra mitad del polvo Miralax con Gatorade al gusto en la segunda taza de 32oz. Llene con agua y mezcle hasta que se disuelva.

Beba un vaso de 8 oz de la solución cada 15 minutos hasta terminar la mezcla.

--	--	--	--

Después de terminar la solución, hay **NADA POR LA BOCA** hasta después de su procedimiento.

Para la boca seca, puede enjuagarse la boca con agua pero debe escupirla. **NO** tragar agua. Debes tener el estómago vacío. Un estómago lleno puede causarle vómitos y provocar aspiración. Si su estómago no está vacío, su procedimiento será cancelado.

TENGA EN CUENTA: No tomar la preparación como se indica puede resultar en un colon mal limpio con posible cancelación o repetición del procedimiento.

Si tiene preguntas, visite nuestro sitio web. www.ocgastrocare.com o llame a nuestra oficina al
(714) 527-6000