



## 대장 내시경을 위한 준비

최상의 검사를 위해서는 대장이 깨끗해야 합니다. 귀하의 검사 준비는 시술 전날 부터 시작됩니다. 시작하기 전에 아래의 지침을 주의 깊게 읽어주세요.

- 시술 3-5일 전부터 모든 혈액 희석제를 중단하세요. ( Plavix, Xarelto, Eliquis, Brilinta, Coumadin 등)
- 시술 5일 전부터 아스피린 325mg 을 중단하세요
- 시술 5일 전부터 철분제를 중단하세요
- 시술 2일 전부터 비타민 C / E 중단하세요
- 시술 2일 전부터 모든 소염제를 중단하세요 (타일레놀은 복용하셔도 됩니다.)
- 당뇨가 있으신 경우, 시술 전날부터 모든 당뇨약을 전반의 양만 복용하세요.

다음의 당뇨 약을 복용하고 계신 경우, 시술 7일 전에 복용을 중단하셔야합니다.

- Ozempic      - Trulicity      - Byetta      - Victoza      - WeGovy      - Mounjaro
- Adlyxin      - Saxenda      - Bydureon      - Rybelsus      - Zepbound

현재 복용하고 계신 약들에 대한 질문이 있으시면 주치의에게 문의하세요

|                                  |
|----------------------------------|
| 시술 전날 ____/____/20____           |
| 모든 음식 금지. 맑은 액체만 섭취하실 수 있습니다     |
| 물                                |
| 맑은 과일 주스                         |
| 차 (설탕 / 꿀 허용)                    |
| 맑은 소다                            |
| 맑은 젤라틴                           |
| 맑은 국물                            |
| 커피 ( 우유 금지)                      |
| 색소가 들어 가지 않은 스포츠 음료              |
| * 메스꺼움이 있으신 경우, 목캔디를 드시면 도움이 됩니다 |
| *** <b>흐리고 어두운 액체 섭취 금지</b>      |

- 위장이 제대로 비워지지 않으면, 수면 마취중에 메스꺼움을 느끼실 수 있고, 구토를 하시게 되면 구토물이 폐로 넘어가 폐렴을 일으킬 수 있고, 환자 분의 안전을 위해 시술이 중단되거나 취소될 수 있습니다.

시술을 수행하는 의사:

주소: \_\_\_\_\_

시술 일자: \_\_\_\_\_ 도착 시각: 오전/오후 \_\_\_\_\_

메모: \_\_\_\_\_

## 대장내시경 검사 전날 음식물 섭취 안내

저잔류 식이 요법을 따르고 장 정결을 시작한 후에는 아무것도 먹지 마십시오. 의사가 달리 지시하지 않는 한 허용된 것을 먹습니다.

### 할 수 있는 것

- 잔류물이 적은 아침식사만 할 수 있습니다. 잔류물이 적은 아침식사를 위한 식품에는 계란, 흰 빵, 코티지 치즈, 요구르트, 그릿츠(옥수수죽), 커피 및 차가 포함됩니다.
- 맑은 액체류를 마실 수 있습니다.

### 할 수 없는 것

- 우유를 마시면 안 되며, 빨간색이나 보라색의 음식을 먹거나 음료를 마셔서는 안 됩니다.
- 술을 마시지 마십시오.
- SUFLAVE 복용 중 기타 완하제를 복용하지 마십시오.
- 각 SUFLAVE 투여를 시작하기 1시간 전에 다른 경구 약물을 복용하지 마십시오.
- 테트라사이클린 또는 플루오로퀴놀론 항생제, 철분, 디곡신, 클로르프로마진 또는 페니실라민을 복용 중인 경우, 각 SUFLAVE 용량을 투여하기 최소 2시간 전 및 최소 6시간 이후에 이러한 약물을 복용하십시오.

### 마셔도 괜찮은 액체류

- 커피, 차(크림이나 비 유제품 크림은 안 됨)
- 과일 주스(과육 없이)
- 젤라틴 디저트류(과일이나 고명 없이)
- 물
- 레몬에이드
- 담옥수

### 참고

- SUFLAVE는 성인의 대장내시경 검사 준비를 위한 결장 세척에 사용하는 삼투성 완하제입니다.
- 복용 중인 모든 약물을 의사에게 알려 주십시오. 여기에는 처방 및 비처방 약물, 비타민 및 약초 보충제가 포함됩니다. SUFLAVE가 다른 약물의 작용 방식에 영향을 미칠 수 있습니다.
- 각 SUFLAVE 용량 투여를 시작하기 전 1시간 이내에 경구 약물을 복용하면 제대로 흡수되지 않을 수 있습니다.
- SUFLAVE 투여 후 가장 흔하게 발생하는 이상반응은 메스꺼움, 복부 팽만, 구토, 복부 통증 및 두통이었습니다.
- 메스꺼움, 팽만감 또는 복부 경련이 발생하는 경우, 증상이 줄어들 때까지 용액 및 추가로 물을 마시는 것을 잠시 중단하거나 속도를 늦추십시오.
- SUFLAVE 복용 후 심각한 구토 또는 탈수 증상이 발생하거나 부정맥 또는 발작을 경험하는 경우 의료서비스 제공자에게 연락하십시오.
- SUFLAVE 복용에 관한 문의 사항이 있는 경우, 담당 의사에게 연락하십시오.

키트에 있는 처방 정보 및 약물 지침을 모두 읽으십시오.  
본 제품에 관해 더 알아보시려면 1-800-874-6756으로 연락하십시오.



**SUFLAVE™**  
(경구 용액용 폴리에틸렌글리콜  
3350, 황산나트륨, 염화칼륨,  
황산마그네슘 및 염화나트륨)  
178.7 g/7.3 g/1.12 g/0.9 g/0.5 g

병과 패킷은 실제 크기대로 표시되지 않았습니다.

## 투여 방법

SUFLAVE는 분할 투여(2일간) 요법입니다. 대장내시경 준비를 완료하기 위해 총 2개의 병이 필요합니다. 2병의 액체를 2회의 별도 용량으로 복용합니다. SUFLAVE 1회 용량은 1병과 향미 개선 패킷 1개를 더한 것과 같습니다.



### 제1일, 투여 1: 대장내시경 전날 초저녁

오후 \_\_\_\_\_ 에 투여 1을 시작합니다.

#### 1단계

향미 개선 패킷 1개를 열어 내용물을 병 하나에 붓습니다.

#### 2단계

제공된 병에 미지근한 물을 채웁니다. 병 뚜껑을 닫은 후 모든 분말이 잘 섞일 때까지(용해될 때까지) 병을 부드럽게 흔듭니다. 최상의 맛을 위해 마시기 전에 한 시간 동안 용액을 냉장 보관하십시오. 얼리지 마십시오. 24시간 내에 사용하십시오.

#### 3단계

병이 비워질 때까지 15분마다 8온스의 용액을 마십니다.

#### 4단계

저녁 동안 추가로 16온스의 물을 마십니다.

**중요:** 메스꺼움, 팽만감 또는 복부 경련이 발생하는 경우, 증상이 줄어들 때까지 용액 및 추가로 물을 마시는 것을 잠시 중단하거나 속도를 늦추십시오.



병과 패킷은 실제 크기대로 표시되지 않았습니다.

### 제2일, 투여 2: 대장내시경 검사일 아침(대장내시경 검사 5-8시간 전, 그리고 투여 1을 시작한지 적어도 4시간 후)

오전 \_\_\_\_\_ 에 투여 2를 시작합니다.

#### 1단계

제1일, 투여 1의 1-3단계를 반복합니다.

#### 2단계

오전 동안 추가로 16온스의 물을 마십니다.

**중요:** 대장내시경을 받을 때까지 계속해서 맑은 액체류만 마십니다. 대장내시경 최소 2시간 전에 액체류를 마시는 것을 중단합니다.



병과 패킷은 실제 크기대로 표시되지 않았습니다.

대장내시경 최소 2시간 전에 액체류를 마시는 것을 중단합니다.

교육 서비스 제공 **BrainTree**  
A PART OF SEBELA PHARMACEUTICALS®