



대장 내시경을 위한 준비

최상의 검사를 위해서는 대장이 깨끗해야 합니다. 귀하의 검사 준비는 시술 전날 부터 시작됩니다. 시작하기 전에 아래의 지침을 주의 깊게 읽어주세요.

- 시술 3-5일 전부터 모든 혈액 희석제를 중단하세요. (Plavix, Xarelto, Eliquis, Brilinta, Coumadin 등)
- 시술 5일 전부터 아스피린 325mg 을 중단하세요
- 시술 5일 전부터 철분제를 중단하세요
- 시술 2일 전부터 비타민 C / E 중단하세요
- 시술 2일 전부터 모든 소염제를 중단하세요 (타일레놀은 복용하셔도 됩니다.)
- 당뇨가 있으신 경우, 시술 전날부터 모든 당뇨약을 전반의 양만 복용하세요.

다음의 당뇨 약을 복용하고 계신 경우, 시술 7일 전에 복용을 중단하셔야합니다.

- Ozempic - Trulicity - Byetta - Victoza - WeGovy - Mounjaro
- Adlyxin - Saxenda - Bydureon - Rybelsus - Zepbound

현재 복용하고 계신 약들에 대한 질문이 있으시면 주치의에게 문의하세요

시술 전날 ____/____/20____
모든 음식 금지. 맑은 액체만 섭취하실 수 있습니다
물
맑은 과일 주스
차 (설탕 / 꿀 허용)
맑은 소다
맑은 젤라틴
맑은 국물
커피 (우유 금지)
색소가 들어 가지 않은 스포츠 음료
* 메스꺼움이 있으신 경우, 목캔디를 드시면 도움이 됩니다
*** 흐리고 어두운 액체 섭취 금지

- 위장이 제대로 비워지지 않으면, 수면 마취중에 메스꺼움을 느끼실 수 있고, 구토를 하시게 되면 구토물이 폐로 넘어가 폐렴을 일으킬 수 있고, 환자 분의 안전을 위해 시술이 중단되거나 취소될 수 있습니다.

의료서비스 제공자 정보

이름:
주소:
도시:
주:
우편번호:
전화:
팩스:

SUPREP® BOWEL PREP KIT

(황산나트륨, 황산칼륨 및 황산마그네슘)
경구 용액

성인용

6온스당 (17.5g/3.13g/1.6g)



SUPREP 장정결제 키트는 분할 투여(2일간) 요법입니다. 완전정결을 위해 6온스 병 두 개가 모두 필요합니다.

1차 투여: 수술 전날 밤 오후 _____에 1단계를 시작해 아래 그림과 같이 진행하십시오.


잠자리에 들기 전에 6온스 병 한(1) 개를 사용해 1~4단계를 완료해야 합니다.

1단계



SUPREP 액체 6온스 병
한(1) 개를 혼합용 용
기에 붓습니다.

2단계



차가운 식수를 용기의
16온스 선까지 채우고
혼합합니다.

참고: 사용하기 전에
지시에 따라 농축액을
희석하십시오.

3단계



용기의 액체를 모두
마십니다.

4단계



다음 1시간 내에
16온스 용기로 물
두(2) 잔을 더 마셔야
합니다.

2차 투여: 수술 당일날 오전 _____에 1단계를 시작해 위의 그림과 같이 진행하십시오.

이 투여를 위해 다른 6온스 병을 사용해 위의 1~4단계를 반복하십시오.

참고: 대장내시경 검사 최소 2시간 전에, 또는 지시에 따라 마지막 물을 모두 마셔야 합니다.

(추가 지침은 다른 페이지를 참조하십시오.)