



OC GastroCare

PREPARACIÓN DE LA COLONOSCOPIA

Para realizar el mejor examen posible, su colon debe estar limpio. Su preparación comenzará el día antes de su procedimiento.

Lea atentamente las instrucciones antes de comenzar.

- AUTORIZACIÓN PENDIENTE:** Detener los anticoagulantes (Plavix, Xarelto, Eliquis, Effient, Coumadin/Warfarina) DE TRES A CINCO DÍAS antes del procedimiento.
-Detener aspirina 325 mg CINCO DÍAS antes del procedimiento. -Detener Hierro CINCO DÍAS antes del procedimiento.
-Detener las vitaminas C y E DOS DÍAS antes del procedimiento. -Detener medicación antiinflamatoria DOS DÍAS antes del procedimiento. (Se puede tomar Tylenol).

Si es **DIABÉTICO**, tome media dosis de su medicamento para la diabetes a partir del día anterior a su(s) procedimiento(s). Si tiene más preguntas, consulte a su proveedor de atención primaria.

ATENCIÓN: Por favor **DETENER** siguientes medicamentos 7 días antes de los procedimientos:

- OZEMPIC -BYETTA -ADLYXIN -BYDUREON -RYBELSUS
-TRULICIDAD -VICTOZA -SAXENDA -WEGOVY -ZEPBOUND -MOUNJARO

A PARTIR DEL ____ / ____ / 20 ____ TODO EL DÍA

DIETA DE LÍQUIDO CLARO

LOS LÍQUIDOS CLAROS INCLUYEN:

- Agua
- Caldo
- Agua de Coco (SIN PULPA)
- Jugos Claros (SIN PULPA) - Manzana, BLANCO Arándano, BLANCO Uva
- Café (NEGRO - NO productos lácteos)
- Té (CALIENTE o FRÍO), azúcar o miel está bien (NO productos lácteos)
- Bebidas deportivas: sólo claras, NO verde, morado o rojo
- Refrescos carbonatados claros - Sprite, 7UP y/o Ginger Ale
- Gelatina amarilla (NO coberturas) - **PARAR DESPUÉS DE LAS 5:00 P.M.**
- Puede utilizar pastillas mentoladas para ayudar a tolerar la preparación (pastillas para la tos Halls)
- ★ **NO tenga líquidos oscuros (rojo, naranja, verde, azul o morado)**
- ★ **NO consuma alimentos sólidos, productos lácteos y líquidos turbios.**
- ★ **DEJE de tomar todos los líquidos claros después de medianoche, excepto el agua.**

*Si tiene la boca seca, puede enjuagarse con agua y escupir. NO trague el agua. Si su estómago no está vacío, puede sentir náuseas con sedación y vomitar provocando neumonía.

INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR DE ATENCIÓN MÉDICA

Nombre:

Dirección:

Ciudad:

Estado:

Código postal:

Teléfono:

Fax:

SUPREP®

KIT PARA

PREPARACIÓN INTESTINAL

(sulfato de sodio, sulfato de potasio y sulfato de magnesio)
Solución oral

Para adultos

(17.5 g/3.13 g/1.6 g) cada 6 onzas




SUPREP Kit para preparación intestinal es un tratamiento de dosis dividida (2 días). Se necesitan ambos frascos de 6 onzas para una preparación completa.

PRIMERA DOSIS: comience el paso 1 a las _____ p. m. la noche anterior a su procedimiento y siga las instrucciones que se muestran a continuación:


Debe completar los pasos 1 a 4 usando un (1) frasco de 6 onzas antes de acostarse:

PASO 1



Vierta **UN** (1) frasco de 6 onzas del líquido SUPREP en el recipiente para mezclar.

PASO 2



Agregue agua fría hasta la línea de 16 onzas del recipiente y mezcle.

NOTA: diluya la solución concentrada según las instrucciones antes de usarla.

PASO 3



Beba **TODO** el líquido en el recipiente.

PASO 4



Usted **deberá** beber dos (2) recipientes más de 16 onzas de agua durante la siguiente hora.

SEGUNDA DOSIS: comience el paso 1 a las _____ a. m. la mañana de su procedimiento y siga las instrucciones que se muestran arriba:

Para esta dosis, repita los pasos 1 a 4 que se indican anteriormente usando el otro frasco de 6 onzas.

NOTA: usted **deberá** terminar de beber el último vaso de agua al menos 2 horas, o según las instrucciones, antes de la colonoscopia.

(Consulte la otra página para obtener más instrucciones).