



PREPARACIÓN DE LA COLONOSCOPIA

Para realizar el mejor examen posible, su colon debe estar limpio. Su preparación comenzará el día antes de su procedimiento.

Lea atentamente las instrucciones antes de comenzar.

-AUTORIZACIÓN PENDIENTE: Detener los anticoagulantes (Plavix, Xarelto, Eliquis, Effient, Coumadin/Warfarina) DE TRES A CINCO DÍAS antes del procedimiento.

-Detener aspirina 325 mg CINCO DÍAS antes del procedimiento. -Detener Hierro CINCO DÍAS antes del procedimiento.

-Detener las vitaminas C y E DOS DÍAS antes del procedimiento. -Detener medicación antiinflamatoria DOS DÍAS antes del procedimiento. (Se puede tomar Tylenol).

Si es **DIABÉTICO**, tome media dosis de su medicamento para la diabetes a partir del día anterior a su(s) procedimiento(s). Si tiene más preguntas, consulte a su proveedor de atención primaria.

ATENCIÓN: Por favor **DETENER** siguientes medicamentos **7 días** antes de los procedimientos:

-OZEMPIC -BYETTA -ADLYXIN -BYDUREON -RYBELSUS

-TRULICIDAD -VICTOZA -SAXENDA -WEGOVY -ZEPBOUND -MOUNJARO

A PARTIR DEL ____ / ____ / 20____ TODO EL DÍA

DIETA DE LÍQUIDO CLARO

LOS LÍQUIDOS CLAROS INCLUYEN:

- Agua
- Caldo
- Agua de Coco (**SIN PULPA**)
- Jugos Claros (**SIN PULPA**) - Manzana, **BLANCO** Arándano, **BLANCO** Uva
- Café (**NEGRO** - **NO** productos lácteos)
- Té (**CALIENTE** o **FRÍO**), azúcar o miel está bien (**NO** productos lácteos)
- Bebidas deportivas: sólo claras, **NO** verde, morado o rojo
- Refrescos carbonatados claros - Sprite, 7UP y/o Ginger Ale
- Gelatina amarilla (**NO** coberturas) - **PARAR DESPUÉS DE LAS 5:00 P.M.**
- Puede utilizar pastillas mentoladas para ayudar a tolerar la preparación (pastillas para la tos Halls)
- ★ **NO tenga líquidos oscuros (rojo, naranja, verde, azul o morado)**
- ★ **NO consuma alimentos sólidos, productos lácteos y líquidos turbios.**
- ★ **DEJE de tomar todos los líquidos claros después de medianoche, excepto el agua.**

*Si tiene la boca seca, puede enjuagarse con agua y escupir. **NO** trague el agua. Si su estómago no está vacío, puede sentir náuseas con sedación y vomitar provocando neumonía.



OC GastroCare

SUTAB es un régimen de dosis dividida (de 2 días). Se requieren un total de 24 tabletas para completar la preparación para la colonoscopia.

Tomará las tabletas en dos dosis de 12 tabletas cada una.


Debe consumir agua con cada dosis de SUTAB, y también debe beber agua adicional después de cada dosis.

Dosis 1 - Noche anterior a la colonoscopia:

- A las 5PM de la noche anterior a su colonoscopia, llene el recipiente proporcionado con 16 onzas de agua (hasta la línea de llenado).
- Trague 1 tableta de SUTAB cada 2-3 minutos hasta que termine las 12 tabletas y las 16 onzas de agua en un plazo de 30 minutos.
- Aproximadamente una hora después, llene nuevamente el recipiente proporcionado con 16 onzas de agua y beba toda la cantidad en un plazo de 30 minutos.
- Aproximadamente 30 minutos después de terminar el segundo recipiente de agua, nuevamente llene el recipiente proporcionado con 16 onzas de agua y beba toda la cantidad en un plazo de 30 minutos.



Tablets not shown actual size.



Dosis 2 - Mañana de la colonoscopia:

- 5 horas antes del procedimiento de colonoscopia, repita las instrucciones de la dosis 1 ahora con la dosis 2 de las tabletas SUTAB.
- Llene el recipiente proporcionado con 16 onzas de agua (hasta la línea de llenado) y trague 1 tableta de SUTAB cada 2-3 minutos hasta que termine las 12 tabletas y las 16 onzas de agua en un plazo de 30 minutos.
- Aproximadamente una hora después, llene nuevamente el recipiente proporcionado con 16 onzas de agua y beba toda la cantidad en un plazo de 30 minutos.
- 30 minutos después de terminar el segundo recipiente de agua, nuevamente llene el recipiente proporcionado con 16 onzas de agua y beba toda la cantidad en un plazo de 30 minutos.
- Independientemente de cuándo termine la segunda dosis, asegúrese de dejar de beber cualquier líquido (excepto agua) al menos 4 horas antes de la hora programada para su colonoscopia.



Tablets not shown actual size.

